

レジメン名称 : 呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg)	360mg	360mg	360	mg
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg)	6 (AUC)	6.3 (AUC)	6	AUC
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液 (200mg 1000mg)	1000mg/m2	1050mg/m2	1000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1袋	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:30						
03	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:35						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:05						
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:10						
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液 (200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント	0mg 1B	12:40						

レジメン名称 : 呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2A 1袋							
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
03	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
05	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
06	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプ°レピ°タト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で	1B	11:00						

レジメン名称 : 呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
08	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CBDCA/Nivo・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						