

レジメン名称 : 呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレタト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg)	360mg	360mg	360	mg
05	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg)	200mg/m2	210mg/m2	200	mg/m2
06	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg)	6 (AUC)	6.3 (AUC)	6	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ファモチジン注射液 20mg/2mL アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 112ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレタト125mg内服 day2.3確認	1.5V 1A 1A 1袋	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:30						
03	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター使用	0mg 1B	10:35						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:05						
05	点滴注射	[PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 3時間で	0mg 1袋	11:10						

レジメン名称 : 呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレピタム

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター使用 血管外漏出に注意 カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレピタム 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で	0mg 1袋	14:10						
07	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 アレルギーに注意 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / Nivo・アプレピタム 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	15:40						