

レジメン名称 : リ膠 血管炎リツキシマブ[®] (700mg) (2回目～)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|---------------------|-------|-------|-----|----|
| 02 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) | 200mg | 200mg | 200 | mg |
| 03 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) | 500mg | 500mg | 500 | mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:リ膠 血管炎リツキシマブ [®] (700mg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1A 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:リ膠 血管炎リツキシマブ [®] (700mg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h | 0mg 180mL | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:リ膠 血管炎リツキシマブ [®] (700mg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 269ml/h : *点滴時間 1.67時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h | 0mg 450mL | 12:00 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:リ膠 血管炎リツキシマブ [®] (700mg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用 | 1B | 1回 | | | | | | |