

レジメン名称 : NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタント(d1)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg)	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
03	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトン点滴静注パック 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタント(d1) 点滴注射: 点滴速度 103ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	3A 1袋	10:00						
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタント(d1) 点滴注射: 点滴速度 375ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタント(d1) 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	12:30						
04	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタント(d1) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	14:00						