

レジメン名称 : NDP/CPT-11(ネパ・トポ)アプレビタント(d15)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg)	50mg/m2	100mg	50	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネパ・トポ)アプレビタント(d15) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2A 1袋	10:00						
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネパ・トポ)アプレビタント(d15) 点滴注射: 点滴速度 375ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネパ・トポ)アプレビタント(d15) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:30						