

レジメン名称 : PLD(ドキシル) (90mg未満)/BV(10mg/kg) (d1)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|---------------------|---------|--------|-----|-------|
| 03 | 点滴注射 | ドキシル注 20mg | 40mg/m2 | 80mg | 40 | mg/m2 |
| 06 | 点滴注射 | アバスチン注(100mg 400mg) | 10mg/kg | 1000mg | 10 | mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:PLD(ドキシル) (90mg未満)/BV(10mg/kg) (点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1V 1袋 | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:PLD(ドキシル) (90mg未満)/BV(10mg/kg) (点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | ドキシル注 20mg ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:PLD(ドキシル) (90mg未満)/BV(10mg/kg) (点滴注射: 点滴速度 433ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 10:45 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | IR対策にフローサイン使用 手足症候群の予防でアイシング ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:PLD(ドキシル) (90mg未満)/BV(10mg/kg) (点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1V | 12:15 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:PLD(ドキシル) (90mg未満)/BV(10mg/kg) (点滴注射: *点滴速度 300ml/h : 点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 12:45 | | | | | | |
| 06 | 点滴注射 | アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL | 0mg 1B | 12:50 | | | | | | |

