

レジメン名称 : PLD(トキシル) 【90mg以上】 /BV(10mg/kg) (d15) インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg)	10mg/kg	1000mg	10	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:PLD(トキシル) 【90mg以上】 /BV(10mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 2回目以降30分まで短縮可能	0mg 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:PLD(トキシル) 【90mg以上】 /BV(10mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:00						
03	点滴注射	ルートキープ用 生理食塩液 50mL 療法名:PLD(トキシル) 【90mg以上】 /BV(10mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 アバスチン後フラッシュ用	1B	1回						