

レジメン名称 : 大腸 5FU/1-LV

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	210mg/m2	200	mg/m2
03	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	400mg/m2	420mg/m2	400	mg/m2
05	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	2400mg/m2	2520mg/m2	2400	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	グラセトン点滴静注パック 3mg/50mL 療法名:大腸 5FU/1-LV 中心静脈注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	10:15						
02	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 5FU/1-LV 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 5FU/1-LV 中心静脈注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1B	12:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 5FU/1-LV 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	12:33						
05	中心静脈注射	ポンプ前フラッシュ フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 5FU/1-LV 中心静脈注射: 点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1B	12:36						
06	静脈注射	ヘパリンNaパック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:大腸 5FU/1-LV	1本	1回						

