

レジメン名称 : 大腸 5FU/1-LV(RPMI)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	250mg	500mg	250	mg
03	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	500mg/m2	1000mg	500	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:大腸 5FU/1-LV(RPMI) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 5FU/1-LV(RPMI) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:大腸 5FU/1-LV(RPMI) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 5FU/1-LV(RPMI) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:30						