

レジメン名称 : 大腸&lt;BSA2㎡以上&gt;XELIRI/Bmab・アプレクト インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	7.5mg/kg	7.5mg/kg	7.5	mg/kg
04	点滴注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	150mg/m2	150mg/m2	150	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸<BSA2㎡以上>XELIRI/Bmab・アプレクト 点滴注射: 点滴速度 217ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	3A 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:大腸<BSA2㎡以上>XELIRI/Bmab・アプレクト 点滴注射: 点滴速度 66.8ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	2回目以降30分まで短縮可 生理食塩液 50mL 療法名:大腸<BSA2㎡以上>XELIRI/Bmab・アプレクト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:00						
04	点滴注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:大腸<BSA2㎡以上>XELIRI/Bmab・アプレクト 点滴注射: 点滴速度 833ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	12:15						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸<BSA2㎡以上>XELIRI/Bmab・アプレクト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	13:45						