

レジメン名称 : 大腸 FOLFIRI/RAM・アプ°レ°タント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	中心静脈注射	サイラムザ注 (100mg 500mg)	8mg/kg	800mg	8	mg/kg
05	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2
06	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	150mg/m2	300mg	150	mg/m2
07	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
09	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	2400mg/m2	4800mg	2400	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	デキサート注射液 1.65mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプ°レ°タント 中心静脈注射: 点滴速度 219ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 アプ°レ°タント125mg内服 day2.3確認 20cmエクステンション	3A 1A 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプ°レ°タント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	10:30						
03	中心静脈注射	サイラムザ注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプ°レ°タント 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 2回目以降30分まで短縮可能 フィルター使用	0mg 1袋	10:35						
04	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプ°レ°タント 中心静脈注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	11:35						

レジメン名称 : 大腸 FOLFIRI/RAM・アプレタント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
05	中心静脈注射	3コース目以降 フラッシュ用として600ml/h レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈側管1	0mg 1袋	12:35						
06	中心静脈注射	カンプト同時投与 (側管より) カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 625ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	12:35						
07	中心静脈注射	レボホリナートと同時スタート フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で	0mg 1B	14:35						
08	点滴注射	投与経路:中心静脈ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプレタント 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	14:38						
09	中心静脈注射	ポンプ前フラッシュ フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で	0mg 1B	14:41						
10	静脈注射	投与経路:中心静脈ルートメイン1 終了日時確認 ポンプ内充填 刺入部センサー固定 クレマ開放 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:大腸 FOLFIRI/RAM・アプレタント	1本	1回						

