

レジメン名称 : 大腸 FOLFIRI・アプレピタント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|--------|---------------------------|-----------|--------|------|-------|
| 02 | 中心静脈注射 | カンプト点滴静注 100mg/5mL | 150mg/m2 | 300mg | 150 | mg/m2 |
| 03 | 中心静脈注射 | レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) | 200mg/m2 | 400mg | 200 | mg/m2 |
| 04 | 中心静脈注射 | フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) | 400mg/m2 | 800mg | 400 | mg/m2 |
| 06 | 中心静脈注射 | フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) | 2400mg/m2 | 4800mg | 2400 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|--------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 中心静脈注射 | デキサート注射液 1.65mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFIRI・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 217ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 アプレピタント125mg内服 day2.3確認 20cmエクステンション内服30分後開始 | 3A 1A 1V 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 中心静脈注射 | カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 FOLFIRI・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 625ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈側管1 レボホリナートと同時スタート | 0mg 1袋 | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 中心静脈注射 | レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 FOLFIRI・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 カンプト同時スタート (側管より) | 0mg 1袋 | 10:30 | | | | | | |
| 04 | 中心静脈注射 | フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 0mg 1B | 12:30 | | | | | | |

レジメン名称 : 大腸 FOLFIRI・アプレピタント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|--------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 05 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI・アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ポンプ 前フラッシュ | 1B | 12:33 | | | | | | |
| 06 | 中心静脈注射 | フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFIRI・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 終了日時 ポンプ 内充填 刺入部センサー固定 クレミア開放 | 0mg 1B | 12:36 | | | | | | |
| 07 | 静脈注射 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:大腸 FOLFIRI・アプレピタント 静脈内注射: 自宅持ち帰り PDA登録 | 1本 | 1回 | | | | | | |