

レジメン名称 : 大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	アービタックス注射液 100mg	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2
05	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg) (毒薬)	85mg/m2	170mg	85	mg/m2
06	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
08	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	2400mg/m2	4800mg	2400	mg/m2
11	点滴注射	アービタックス注射液 100mg	250mg/m2	500mg	250	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg ポラミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回) 中心静脈注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1V 1A 1A 1V 1B	10:00						
02	中心静脈注射	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回) 中心静脈注射: 点滴速度 4125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回) 中心静脈注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	12:30						
04	中心静脈注射	アービタックス後 経過観察用 レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回) 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 エルプラットと同時	0mg 1袋	13:30						
	<次ページあり>									

レジメン名称 : 大腸 FOLFOX6/アビタックス(初回)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
05	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アビタックス(初回) 中心静脈注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈側管1	0mg 1袋	13:30						
06	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アビタックス(初回) 中心静脈注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 急速静注	0mg 1B	15:30						
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アビタックス(初回) 点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ポンプ前フラッシュ	1B	15:33						
08	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アビタックス(初回) 中心静脈注射: 点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 3500mg未満:全量100mLに調製 3500mg以上:全量90mLに調製	0mg 1B	15:36						
09	静脈注射	ハリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アビタックス(初回) 静脈内注射:	1本	1回						
10	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アビタックス(初回) 点滴注射: 点滴速度 210ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1V 1A 1A 1B							
	<次ページあり>									

レジメン名称 : 大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
11	点滴注射     <次ページあり>	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回) 点滴注射: 点滴速度 5250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋							



レジメン名称 : 大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8					
07	点滴注射	点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 急速静注 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)	1B						
08	中心静脈注射	点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ポンプ前フラッシュ フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)	0mg 1B						
09	静脈注射	中心静脈注射: 点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 3500mg未満:全量100mLに調製 3500mg以上:全量90mLに調製 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)	1本	1回					
10	点滴注射	静脈内注射: デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)	1V 1A 1A 1B	10:00					
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 210ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 FOLFOX6/アービタックス(初回)	0mg 1袋	10:30					
		点滴注射: 点滴速度 5250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1							