

レジメン名称 : 大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レピ°タト

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	5mg/kg	500mg	5	mg/kg
04	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	165mg/m2	330mg	165	mg/m2
05	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2
06	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg)(毒薬)	85mg/m2	170mg	85	mg/m2
08	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	3200mg/m2	6400mg	3200	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レピ° 中心静脈注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 アプ°レピ°タト125mg内服day2.3確認 20cmエクステンション	1.5V 1A 1V 1B	10:00						
02	中心静脈注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レピ° 中心静脈注射: 点滴速度 66.8ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 2回目;60分、3回目以降;30分 *外科は2回目以降;30分	0mg 1B	10:30						
03	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レピ° 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	12:00						
04	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レピ° 中心静脈注射: 点滴速度 1075ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	12:05						

レジメン名称 : 大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レ°タト

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
05	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レ° 中心静脈注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	13:05						
06	点滴注射	L-OHPと同時に投与 (側管より) エルプラット点滴静注液 (50mg 100mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レ° 点滴注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 レボホリナートと同時スタート アレルギーに注意	0mg 1袋	13:05						
07	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レ° 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1 B	15:05						
08	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レ° 中心静脈注射: 点滴速度 334ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 終了日時確認 ポンプ内充填 刺入部センサー固定 クレーム開放	0mg 1 B	15:10						
09	静脈注射	ヘパリンNaパック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI/Bmab (5mg/kg)アプ°レ° 静脈内注射: 持ち帰り PDA登録 ジラスタ注射確認	1本	1回						