

レジメン名称 : 大腸 XELIRI (セロタ/CPT-11) イメド

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	150mg/m2	300mg	150	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 XELIRI (セロタ/CPT-11) イメド 点滴注射: 点滴速度 217ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	3A 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 XELIRI (セロタ/CPT-11) イメド 点滴注射: 点滴速度 833ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 XELIRI (セロタ/CPT-11) イメド 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:00						