

レジメン名称 : 大腸 パニツマブ<sup>®</sup> (ベクティビックス)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL	6mg/kg	600mg	6	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 パニツマブ <sup>®</sup> (ベクティビックス) 中心静脈注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1V 1A 1A 1B	10:00						
02	中心静脈注射	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 パニツマブ <sup>®</sup> (ベクティビックス) 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 フィルター使用	0mg 1B	10:15						
03	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 パニツマブ <sup>®</sup> (ベクティビックス) 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 *初回のみ50ml/h 1時間投与	1B	11:15						