

レジメン名称 : 胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド<sup>®</sup>(初回)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	トラスツズマブBS点滴静注 (60mg 150mg)	8mg/kg	800mg	8	mg/kg
06	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:00						
02	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 203ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋	11:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						
04	点滴注射	ルートキープ用 トラスツズマブBS点滴静注 (60mg 150mg) 蒸留水(注射用) 100mL 生理食塩液 250mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 186ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 30mL 1袋	11:30						
05	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	13:00						
06	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	0mg	13:30						

レジメン名称 : 胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド<sup>®</sup>(初回)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
07	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 850ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管2 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」	1袋							
		療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フロセミド注射液 20mg/2mL	1袋	14:00 18:00						
08	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」	1A 1B	15:30						
09	点滴注射	療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 62.5ml/h : *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」	1袋	22:00						
10	点滴注射	療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL	1袋		06:00	06:00				
11	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 338ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg	8mL 1袋		07:30	07:30				
12	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】)イメド <sup>®</sup> (初 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分 投与経路:末梢側管1	1V 1B		07:30	07:30				

レジメン名称 : 胃 SPH(TS-1/CDDP/H【BS】) イント<sup>®</sup> (初回)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
----	----	------	-------	------	------	------	--	--	--	--