

レジメン名称 : 胃 5FU/MTX

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リトレキート(5mg50mg200mg1000mg)	100mg	100mg	100	mg
03	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	600mg/m2	1200mg	600	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	7%メイロン静注 20mL ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:胃 5FU/MTX 点滴注射: 点滴速度 130ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1袋	09:00						
02	点滴注射	リトレキート(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:胃 5FU/MTX 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1V	10:00						
03	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:胃 5FU/MTX 点滴注射: 点滴速度 3100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 1V	10:30						
04	点滴注射	ロイコボリン注 3mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:胃 5FU/MTX 点滴注射: 点滴速度 55ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	15mg 1B		10:30 16:30 22:30	04:30 10:30 16:30				