

レジメン名称 : 臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg	125mg/m2	250mg	125	mg/m2
04	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 114ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 80ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター禁止 生食はアブ`ラキサンの採取量に変更	0mg 40mL	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:00						
04	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分で投与 血管痛に配慮	0mg 1B	11:05						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で	1B	11:35						

レジメン名称 : 臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 114ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 80ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フィルター禁止 生食はアブ`ラキサンの採取量に変更	0mg 40mL	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:00						
04	点滴注射	ゲムシタピン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分で投与 血管痛に配慮	0mg 1B	11:05						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:臍 nab-PTX(アブ`ラキサン)/GEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:35						