

レジメン名称：皮膚 モカ`ムス`マブ` (ポ`テリジ`オ) (6回目以降)

インターバル日数：14 日

基準日： Day 1

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ポテリジオ点滴静注 20mg/5mL	1mg/kg	100mg	1	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名：皮膚 モカ`ムス`マブ` (ポ`テリジ`オ) (6回目以降) 点滴注射： 点滴速度 102ml/h：*点滴時間 30分で 投与経路：末梢ルートメイン1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	ポテリジオ点滴静注 20mg/5mL 生理食塩液 250mL 療法名：皮膚 モカ`ムス`マブ` (ポ`テリジ`オ) (6回目以降) 点滴注射： 点滴速度 125ml/h：*点滴時間 2時間で 投与経路：末梢ルートメイン1 医師の指示で持続静注もあり	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名：皮膚 モカ`ムス`マブ` (ポ`テリジ`オ) (6回目以降) 点滴注射： 点滴速度 600ml/h：*点滴時間 5分で 投与経路：末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	1回						