

レジメン名称 : 腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (初回)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|-----------------|------|------|-----|----|
| 02 | 点滴注射 | トーリセル点滴静注液 25mg | 25mg | 25mg | 25 | mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (初回) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1A 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | トーリセル点滴静注液 25mg 生理食塩液 250mL 療法名:腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (初回) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (初回) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 11:30 | | | | | | |