

レジメン名称 : 尿路 アベルマブ (2回目以降)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	バベンチオ点滴静注 200mg	10mg/kg	1000mg	10	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 アベルマブ (2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 アベルマブ (2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	バベンチオ点滴静注 200mg 生理食塩液 250mL 療法名:尿路 アベルマブ (2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 アベルマブ (2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:00						
05	点滴注射	アセリオ静注バッグ (1,000mg/100mL) 療法名:尿路 アベルマブ (2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 バベンチオの1時間前に投与	1000mg	1回						