

レジメン名称：精巣 BEP・イット

インターバル日数：21 日

基準日： Day 1

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ブレオ注 5mg	30mg	30mg	30	mg
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
04	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	20mg/m2	40mg	20	mg/m2
14	点滴注射	ブレオ注 5mg	30mg	30mg	30	mg
16	点滴注射	ブレオ注 5mg	30mg	30mg	30	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グレースロン点滴静注 [®] 3mg/50mL 療法名:精巣 BEP・イット [®] 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1袋	10:00						
02	点滴注射	ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名:精巣 BEP・イット [®] 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:精巣 BEP・イット [®] 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋	11:00	10:30	10:30	10:30	10:30		
04	点滴注射	day 1 のみ末梢側管1より投与 シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:精巣 BEP・イット [®] 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋	14:00	13:30	13:30	13:30	13:30		
05	点滴注射	day 1 のみ末梢側管1より投与 ソリューゲン F注 500mL 療法名:精巣 BEP・イット [®] 点滴注射:	1本	16:00						

レジメン名称 : 精巣 BEP・イムト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキササート注射液 6.6mg グラネトロン点滴静注パック [®] 3mg/50mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1袋							
02	点滴注射	ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
03	点滴注射	ベプト [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋							
04	点滴注射	day 1 のみ末梢側管1より投与 シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋							
05	点滴注射	day 1 のみ末梢側管1より投与 ソリューゲン F注 500mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本							
06	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1A 1B							
07	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL	1本							

レジメン名称：精巣 BEP・イムト[®]

インターバル日数：21 日

基準日： Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
08	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 41.6ml/h : *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン F注 500mL	1本							
09	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注パック [®] 3mg/50mL	1V 1袋							
10	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 グラセトン点滴静注パック [®] 3mg/50mL	1袋							
11	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL	1本							
12	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン F注 500mL	1本	09:00 12:00						
13	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL	1B	10:00 10:35						
14	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1 ケセーフ用、フラッシュ用 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL	0mg 1B	10:05						

レジメン名称 : 精巣 BEP・イムト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキササート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注パック 3mg/50mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1袋							
02	点滴注射	ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	0mg 1B							
03	点滴注射	ベプト [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋							
04	点滴注射	day 1 のみ末梢側管1より投与 シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管2	0mg 1袋							
05	点滴注射	day 1 のみ末梢側管1より投与 ソリューゲン F注 500mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本							
06	点滴注射	フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1A 1B							
07	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL	1本							

レジメン名称：精巣 BEP・イムト[®]

インターバル日数：21 日

基準日： Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
08	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 41.6ml/h : *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン F注 500mL	1本							
09	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ [®] 3mg/50mL	1V 1袋							
10	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 グラセトン点滴静注バッグ [®] 3mg/50mL	1袋							
11	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL	1本							
12	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン F注 500mL	1本							
13	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL	1B							
14	点滴注射	療法名:精巣 BEP・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1 ケセーフ用、フラッシュ用 ブレオ注 5mg 生理食塩液 100mL	0mg 1B							

