

レジメン名称：精巣【陰茎】 TIP・アプレタト

インターバル日数：21 日

基準日： Day 1

使用する抗がん剤：

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|-----------------------------|----------|-------------|-----|-------|
| 03 | 点滴注射 | [PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) | 175mg/m2 | 183.75mg/m2 | 175 | mg/m2 |
| 04 | 点滴注射 | イホマイド注 1g | 1.2g/m2 | 1.26g/m2 | 1.2 | g/m2 |
| 06 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) | 25mg/m2 | 26.25mg/m2 | 25 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ポララミン注 5mg/1mL デキサート注射液 6.6mg ファモチジン注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1A 1.5V 1A 1B | 09:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | 09:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | [PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 459ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 0mg 1袋 | 10:00 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | イホマイド注 1g 生理食塩液 500mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 0g 1袋 | 13:00 | 11:00 | 11:00 | | | | |
| 05 | 点滴注射 | ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 648ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢側管1 | 400mg 1B | 13:00 17:00 21:00 | 11:00 15:00 19:00 | 11:00 15:00 19:00 | | | | |

レジメン名称：精巣【陰茎】 TIP・アプレタト

インターバル日数：21 日

基準日： Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|------|--|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 06 | 点滴注射 | 【投与時刻厳守】 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 0mg 1袋 | 15:00 | 16:30 | 16:30 | | | | |
| 07 | 点滴注射 | マンニトールS注射液 300mL(ソルビトール含有) 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | 17:00 | | | | | | |
| 08 | 点滴注射 | ソルデム3A輸液 1L 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 60.6ml/h : *点滴時間 16.5時間 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | 18:00 | | | | | | |
| 09 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1V 1B | | 10:30 | 10:30 | | | | |
| 10 | 点滴注射 | マンニトールS注射液 300mL(ソルビトール含有) 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | | 13:00 | 13:00 | | | | |
| 11 | 点滴注射 | ソリューゲン F注 500mL 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | | 14:00 | 14:00 | | | | |
| 12 | 点滴注射 | ソルデム3A輸液 1L 療法名:精巣【陰茎】 TIP・アプレタト 点滴注射: 点滴速度 62.5ml/h : *点滴時間 16時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | | 18:30 | 18:30 | | | | |

レジメン名称 : 精巢【陰莖】 TIP・アプロピタト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|----|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
|----|----|------|-------|------|------|------|--|--|--|--|