

レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初日72h) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g	27mcg	27mcg	27	mcg
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g	18mcg	18mcg	18	mcg
05	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g	56mcg	56mcg	56	mcg
06	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g	28mcg	28mcg	28	mcg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B	09:30						
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初 点滴注射: 点滴速度 3.87ml/h : *点滴時間 72時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度 : 3ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL	10:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 適宜使用	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL				10:00		10:00	



レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初日72h) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B	09:30						
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 3.87ml/h : *点滴時間 72時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度 : 3ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 適宜使用	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度 : 5ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							
05	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液	0mcg 3mL 5.5mL	10:00		10:00		10:00		



レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初日72h) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B							
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初 点滴注射: 点滴速度 3.87ml/h : *点滴時間 72時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度 : 3ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 適宜使用	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初 点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度 : 5ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							
05	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35μg 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液	0mcg 3mL 5.5mL	10:00		10:00		10:00		



レジメン名称 : ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初日72h) インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	2V 2A 1B							
02	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 3.87ml/h : *点滴時間 72時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度 : 3ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 適宜使用	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液 生理食塩液 20mL 生理食塩液 250mL 療法名:ALLびーリンサイト【45kg以上】1コース目 (初点滴注射: 点滴速度 5.8ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1Vあたり蒸留水3mLで溶解 点滴速度 : 5ml/h	0mcg 3mL 5.5mL 20mL 250mL							
05	点滴注射	ビーリンサイト点滴静注用 35 $\mu$ g 蒸留水 (注射用) 20mL びーリンサイト用 輸液安定化液	0mcg 3mL 5.5mL	10:00		10:00		10:00		

