

レジメン名称 : AML 【D-3】 (AA)ACR/Ara-C

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	アクラシノン注 20mg	20mg/m2	40mg	20	mg/m2
03	点滴注射	シラピン注(400mg1000mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:AML 【D-3】 (AA)ACR/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	1袋	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	
02	点滴注射	アクラシノン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:AML 【D-3】 (AA)ACR/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	0mg 1B	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	
03	点滴注射	シラピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:AML 【D-3】 (AA)ACR/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 187ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:AML 【D-3】 (AA)ACR/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回