

レジメン名称 : APL 【C-1】 MIT/Ara-C

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg)	7mg/m2	14mg	7	mg/m2
03	点滴注射	シラベン注(400mg1000mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
01	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名: APL 【C-1】 MIT/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	1袋	09:00	09:00	09:00				
02	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg) 生理食塩液 100mL 療法名: APL 【C-1】 MIT/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 270ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与。	0mg 1B	09:30	09:30	09:30				
03	点滴注射	シラベン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名: APL 【C-1】 MIT/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 187ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名: APL 【C-1】 MIT/Ara-C 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	