

レジメン名称 : ② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル～)

インターバル日数 : 35 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	静脈注射	ベルケイト注射用 3mg (毒薬)	1.3mg/m2	2.6mg	1.3	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	静脈注射	ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル～) 静脈内注射: 生食3mL/Vで溶解 (1mg/mL)	0mg 1A	1回						
02	静脈注射	生食注射液 10mL 療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル～) 静脈内注射:	1本	1回						
03	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 500mL 療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 251ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1V 1袋	1回						
	<次ページあり>									

レジメン名称 : ② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル~)

インターバル日数 : 35 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	静脈注射	ベルケイト注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル~) 静脈内注射: 生食3mL/Vで溶解 (1mg/mL)	0mg 1A	1回						
02	静脈注射	生食注シリンジ 10mL 療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル~) 静脈内注射:	1本	1回						
03	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 500mL 療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (9サイクル~) 点滴注射: 点滴速度 251ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1V 1袋	1回						