

レジメン名称 : Ph-ALL213 地固め療法C1

インターバル日数 : 24 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技    | 薬剤名称                       | 標準値       | 上限値    | 設定量  | 単位    |
|----|-------|----------------------------|-----------|--------|------|-------|
| 03 | 点滴注射  | リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) | 100mg/m2  | 200mg  | 100  | mg/m2 |
| 04 | 点滴注射  | リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) | 900mg/m2  | 1800mg | 900  | mg/m2 |
| 05 | 脳脊髄注射 | リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) | 15mg      | 15mg   | 15   | mg    |
| 06 | 点滴注射  | シタラビン注(400mg1000mg)        | 2000mg/m2 | 4000mg | 2000 | mg/m2 |

| RP | 手技    | 薬剤名称  | 用量/単位            | Day1           | Day2           | Day3           | Day4 |  |  |  |
|----|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--|--|--|
| 01 | 点滴注射  | ソル・メドロール静注用 40mg<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>点滴注射:<br>点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1  | 50mg<br>1B       | 09:00<br>21:00 | 09:30<br>21:30 | 09:30<br>21:30 |      |  |  |  |
| 02 | 点滴注射  | グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>点滴注射:<br>点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1  | 1袋               | 09:30          | 10:00          | 10:00          |      |  |  |  |
| 03 | 点滴注射  | リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)<br>生理食塩液 100mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>点滴注射:<br>点滴速度 116ml/h : *点滴時間 1時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1                                       | 0mg<br>1B        | 10:00          |                |                |      |  |  |  |
| 04 | 点滴注射  | リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)<br>生理食塩液 500mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>点滴注射:<br>点滴速度 29.3ml/h : *点滴時間 23時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン 1<br>全量500mLに調製<br>【21.7mL/h、23時間で投与】 | 0mg<br>1袋        | 11:00          |                |                |      |  |  |  |
| 05 | 脳脊髄注射 | リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)<br>デキサート注射液 1.65mg<br>生理食塩液 20mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>脳脊髄注射:  | 0mg<br>2A<br>2mL | 1回             |                |                |      |  |  |  |

レジメン名称 : Ph-ALL213 地固め療法C1

インターバル日数 : 24 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技   | 薬剤名称   | 用量/単位     | Day1 | Day2           | Day3                             | Day4                    |  |  |  |
|----|------|--|-----------|------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 06 | 点滴注射 | 腰椎<br>全量3mLに調製<br>シラベン注(400mg1000mg)<br>生理食塩液 500mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>点滴注射:<br>点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>全量500mLに調製 | 0mg<br>1袋 |      | 10:30<br>22:30 | 10:30<br>22:30                   |                         |  |  |  |
| 07 | 点滴注射 | 【170mL/h、3時間で投与】<br>ロイコボリン注 3mg/1mL<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>点滴注射:<br>点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1               | 5A<br>1B  |      | 22:00          | 04:00<br>10:00<br>16:00<br>22:00 | 04:00<br>10:00<br>16:00 |  |  |  |
| 08 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL<br>療法名:Ph-ALL213 地固め療法C1<br>点滴注射:<br>点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>フラッシュ用   | 1B        |      | 2回             | 2回                               |                         |  |  |  |