

レジメン名称 : Ph-ALL213 地固め療法C2

インターバル日数 : 22 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg	45mg/m2	90mg	45	mg/m2
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	1200mg/m2	2400mg	1200	mg/m2
06	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	15mg	15mg	15	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:Ph-ALL213 地固め療法C2 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:15						
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:Ph-ALL213 地固め療法C2 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:45						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:Ph-ALL213 地固め療法C2 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:Ph-ALL213 地固め療法C2 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:Ph-ALL213 地固め療法C2 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回						
06	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	0mg	1回						

レジメン名称 : Ph-ALL213 地固め療法C2

インターバル日数 : 22 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
		デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 20mL 療法名:Ph-ALL213 地固め療法C2 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mLに調製	2A 2mL							