

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction 【2】

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|-------|----------------------------|-----------|--------|------|-------|
| 02 | 点滴注射 | アラノンジー静注用250mg/50mL | 1500mg/m2 | 3000mg | 1500 | mg/m2 |
| 04 | 点滴注射 | エンドキサン注 (100mg 500mg) | 1000mg/m2 | 2000mg | 1000 | mg/m2 |
| 05 | 点滴注射 | キロサイド注 40mg | 75mg/m2 | 150mg | 75 | mg/m2 |
| 06 | 脳脊髄注射 | リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) | 15mg | 15mg | 15 | mg |
| 06 | 脳脊髄注射 | キロサイド注 40mg | 40mg | 40mg | 40 | mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|------|---|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| 01 | 点滴注射 | グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1袋 | 09:30 | | 09:30 | | 09:30 | | |
| 02 | 点滴注射 | アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 | 0mg | 10:00 | | 10:00 | | 10:00 | | |
| 03 | 点滴注射 | 2時間で投与 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 1回 | | 1回 | | 1回 | | |
| 04 | 点滴注射 | フラッシュ用 エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | キロサイド注 40mg 生理食塩液 250mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 1時間で | 0mg 1袋 | | | | | | | |

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction 【2】

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|-----------------------|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 06 | 脳脊髄注射 <次ページあり> | 投与経路:末梢ルートメイン1 リトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL | 0mg 0mg 2A | | | | | | | |

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction 【2】

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
|----|----------|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 点滴注射 | グレーストン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1袋 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | | |
| 02 | 点滴注射 | アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与 | 0mg | | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | |
| 04 | 点滴注射 | フラッシュ用 エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 10:00 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | キロサイド注 40mg 生理食塩液 250mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | | |
| 06 | 脳脊髄注射 | ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL | 0mg 0mg 2A | 1回 | | | | | | |
| | <次ページあり> | | | | | | | | | |

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction 【2】

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 | Day19 | | |
|----|-------|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 01 | 点滴注射 | グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1袋 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | | |
| 02 | 点滴注射 | アラノンジー静注用250mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 【希釈不可】 2時間で投与 | 0mg | | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | | |
| 04 | 点滴注射 | フラッシュ用 エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | キロサイド注 40mg 生理食塩液 250mL 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | | |
| 06 | 脳脊髄注射 | ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 induction 【2】 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL | 0mg 0mg 2A | | | | | | | |