

レジメン名称 : 移植 BuTTCy

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	リサイオ点滴静注液 100mg	5mg/kg	5.25mg/kg	5	mg/kg
04	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	3.2mg/kg	3.36mg/kg	3.2	mg/kg
05	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	1.6mg/kg	1.68mg/kg	1.6	mg/kg
06	中心静脈注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	60mg/kg	63mg/kg	60	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-8	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2
01	中心静脈注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 BuTTCy 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	10:30	10:30
02	中心静脈注射	リサイオ点滴静注液 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:移植 BuTTCy 中心静脈注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1B	09:30	09:30					
03	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:移植 BuTTCy 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
04	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 BuTTCy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 500mL			09:30	09:30			
05	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 BuTTCy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 500mL					09:30		
06	中心静脈注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL	0mg 1袋						11:00	11:00

レジメン名称 : 移植 BuTTCy

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-8	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2
07	中心静脈注射	療法名:移植 BuTTCy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:移植 BuTTCy 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1	1A 1B						11:00 15:00 19:00	11:00 15:00 19:00