

レジメン名称 : 移植 Flu/ivBu2

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -3

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|--------|-------------------|----------|-------|-----|-------|
| 02 | 中心静脈注射 | フルダラ静注用 50mg | 30mg/m2 | 60mg | 30 | mg/m2 |
| 04 | 中心静脈注射 | ブスルフェクス点滴静注用 60mg | 3.2mg/kg | 320mg | 3.2 | mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day-8 | Day-7 | Day-6 | Day-5 | Day-4 | Day-3 | |
|----|--------|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 01 | 中心静脈注射 | グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 Flu/ivBu2 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 1袋 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
| 02 | 中心静脈注射 | フルダラ静注用 50mg 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 100mL 療法名:移植 Flu/ivBu2 中心静脈注射: 点滴速度 205ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 0mg 2.5mL 1B | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| 03 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:移植 Flu/ivBu2 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 1B | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| 04 | 中心静脈注射 | ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 Flu/ivBu2 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 10倍量の生理食塩液に添加 | 0mg 1袋 | | | 10:00 | 10:00 | | | |