

レジメン名称 : 移植 Flu/Mel

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	フルダラ静注用 50mg	25mg/m2	50mg	25	mg/m2
03	静脈注射	アルケラン静注用 50mg (毒薬)	140mg/m2	280mg	140	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2	
01	中心静脈注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 Flu/Mel 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	
02	中心静脈注射	フルダラ静注用 50mg 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 100mL 療法名:移植 Flu/Mel 中心静脈注射: 点滴速度 205ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 2.5mL 1B	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
03	静脈注射	アルケラン静注用 50mg (毒薬) 療法名:移植 Flu/Mel 静脈内注射:	0mg						09:30	
04	中心静脈注射	ソリター-T 2号輸液 500mL 療法名:移植 Flu/Mel 中心静脈注射: 点滴速度 62.5ml/h : *点滴時間 8時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1本						10:30 18:30	
05	静脈注射	生食注シリンジ 10mL 療法名:移植 Flu/Mel 静脈内注射: アルケラン後フラッシュ	1本						1回	