

レジメン名称 : 移植 High dose ICE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	500mg/m2	1000mg	500	mg/m2
03	点滴注射	バプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	150mg/m2	300mg	150	mg/m2
05	点滴注射	イホマイド注 1g	2.5g/m2	5g	2.5	g/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2		
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 High dose ICE 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	10:00	10:00	10:00	11:00			
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:移植 High dose ICE 点滴注射: 点滴速度 3000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:30	10:30	10:30				
03	点滴注射	バプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:移植 High dose ICE 点滴注射: 点滴速度 1250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	11:30 12:30	11:30 12:30	11:30 12:30	11:30 12:30			
04	点滴注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:移植 High dose ICE 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1	2A 1B	13:30 19:30	01:30 07:30 13:30 19:30	01:30 07:30 13:30 19:30	01:30 07:30 13:30 19:30	01:30 07:30		
05	点滴注射	イホマイド注 1g ソリター-T 1号輸液 500mL「YD」 療法名:移植 High dose ICE 点滴注射: 点滴速度 24.3ml/h : *点滴時間 20.5時間 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0g 1袋	13:30	13:30	13:30	13:30			
06	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:移植 High dose ICE	1B	2回	2回	2回	2回			

レジメン名称 : 移植 High dose ICE

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2		
07	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ベブシト`前後フラッシュ 生理食塩液 50mL 療法名:移植 High dose ICE 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回		