

レジメン名称 : A+AVD

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	25mg/m2	50mg	25	mg/m2
04	点滴注射	エクザール注射用 10mg	6mg/m2	10mg	6	mg/m2
05	点滴注射	ダカルバジン注 100mg	375mg/m2	750mg	375	mg/m2
07	点滴注射	アドセトリス点滴静注用50mg	1.2mg/kg	120mg	1.2	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 遮光ルート準備	1V 1B	10:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 700ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管外漏出に注意	0mg 1B	10:45						
04	点滴注射	ダカルバジン調剤の依頼 エクザール注射用 10mg 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管外漏出に注意	0mg 1B	11:00						
05	点滴注射	ダカルバジン注 100mg 蒸留水 (注射用) 100mL <次ページあり>	0mg 40mL	11:15						

レジメン名称 : A+AVD

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	アロキシン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 遮光ルート準備	1V 1B							
02	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1B							
03	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 700ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管外漏出に注意	0mg 1B							
04	点滴注射	ダカルバジン調剤の依頼 エクザール注射用 1 0 mg 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管外漏出に注意	0mg 1B							
05	点滴注射	ダカルバジン注 100mg 蒸留水 (注射用) 100mL ソリター-T 1号輸液 200mL 「YD」 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 遮光して投与 血管痛に配慮	0mg 40mL 1袋							
06	点滴注射 <次ページあり>	ポララミン注 5mg/1mL	1A							

レジメン名称 : A+AVD

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 遮光ルート準備	1V 1B	10:00						
02	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシソルピシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 700ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管外漏出に注意	0mg 1B	10:45						
04	点滴注射	ダカルバジン調剤の依頼 エクザール注射用 1 0 mg 生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管外漏出に注意	0mg 1B	11:00						
05	点滴注射	ダカルバジン注 100mg 蒸留水 (注射用) 100mL ソリター-T 1号輸液 200mL 「YD」 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 遮光して投与 血管痛に配慮	0mg 40mL 1袋	11:15						
06	点滴注射 <次ページあり>	ポララミン注 5mg/1mL	1A	13:15						

レジメン名称 : A+AVD

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
07	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 カロナール内服 アドセトリス点滴静注用50mg 蒸留水(注射用) 100mL 生理食塩液 100mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 280ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 1本あたり10.5mLの蒸留水で溶解 165mg以上は生食250mLで希釈	1B 0mg 40mL 1B	13:45						
08	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:A+AVD 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	14:15						