

レジメン名称 : AEM

インターバル日数 : 8 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg)	5mg/m2	10mg	5	mg/m2
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	80mg/m2	160mg	80	mg/m2
04	点滴注射	シラベリン注(400mg1000mg)	100mg/m2	200mg	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトン点滴静注パック [®] 3mg/50mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:00	09:00	09:00	09:30	09:30	11:30	11:30
02	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg) 生理食塩液 100mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	09:30	09:30	09:30				
03	点滴注射	ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 325ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
04	点滴注射	シラベリン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
06	点滴注射	ケモセーフ用 ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:AEM	1B	2回	2回	2回	2回	2回		

レジメン名称 : AEM

インターバル日数 : 8 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
07	点滴注射 <次ページあり>	点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ベブシト`前後フラッシュ 生理食塩液 50mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 キオサト`後フラッシュ用	1B							

レジメン名称 : AEM

インターバル日数 : 8 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	ゲラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
02	点滴注射	ノバントロン注(10mg 20mg) 生理食塩液 100mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
03	点滴注射	ベプシト 100mg/5mL 【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 325ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
04	点滴注射	シラピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
06	点滴注射	ケモセーフ用 ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:AEM 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B							
07	点滴注射	ベプシト 前後フラッシュ 生理食塩液 50mL 療法名:AEM 点滴注射:	1B	1回						

