

レジメン名称 : DA-EPOCH

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ベブシド <sup>®</sup> 100mg/5mL【専用セット】	50mg/m2	120mg	50	mg/m2
02	中心静脈注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	10mg/m2	24mg	10	mg/m2
02	中心静脈注射	オンコビン 1 mg	0.4mg/m2	0.8mg	0.4	mg/m2
03	中心静脈注射	エトキシカン注 (100mg 500mg)	750mg/m2	1800mg	750	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	中心静脈注射	グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:DA-EPOCH 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	中心静脈注射	ベブシド <sup>®</sup> 100mg/5mL【専用セット】 ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) オンコビン 1 mg 生理食塩液 500mL 療法名:DA-EPOCH 中心静脈注射: 点滴速度 31.2ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 0mg 0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00			
03	中心静脈注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:DA-EPOCH 中心静脈注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋					10:00		
04	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:DA-EPOCH 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1 B					12:00		