

レジメン名称 : mLSG15 AMP (d8)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2
03	点滴注射	サイメリン注50mg	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:mLSG15 AMP (d8) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ドキシルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 50mL 療法名:mLSG15 AMP (d8) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	サイメリン注50mg 生理食塩液 100mL 療法名:mLSG15 AMP (d8) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:45						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:mLSG15 AMP (d8) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:45						