

レジメン名称 : R-ヘンダムスチン(トリアキシン) (R : 500mg) (2回目～) インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg)	500mg	500mg	500	mg
04	点滴注射	トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL	90mg/m2	94.5mg/m2	90	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:R-ヘンダムスチン(トリアキシン) (R : 500mg) (2回) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 カロナール内服	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:R-ヘンダムスチン(トリアキシン) (R : 500mg) (2回) 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h	0mg 450mL	10:30						
03	点滴注射	グレセプトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:R-ヘンダムスチン(トリアキシン) (R : 500mg) (2回) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	13:00	13:00					
04	点滴注射	トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL 生理食塩液 250mL 療法名:R-ヘンダムスチン(トリアキシン) (R : 500mg) (2回) 点滴注射: 点滴速度 610ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 血管痛に配慮	0mg 1袋	13:30	13:30					
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:R-ヘンダムスチン(トリアキシン) (R : 500mg) (2回) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	14:30	14:30					

レジメン名称 : R-ベンダムスチン(トリアキシ) (R : 500mg) (2回目～) インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
----	----	------	-------	------	------	--	--	--	--	--