

レジメン名称 : 血液 PLD(ドキシル)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	ドキシル注 20mg	20mg/m2	40mg	20	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:血液 PLD(ドキシル) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋	10:00						
02	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:血液 PLD(ドキシル) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:30						
03	点滴注射	ドキシル注 20mg ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:血液 PLD(ドキシル) 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:45						
04	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:血液 PLD(ドキシル) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回						