

レジメン名称 : ブレンツキシマブ ヘドチン (アドセトリス)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	アドセトリス点滴静注用50mg	1.8mg/kg	180mg	1.8	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL ハイドロコートン注射液 100mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:ブレンツキシマブ ヘドチン (アドセトリス) 点滴注射: 点滴速度 106ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	アドセトリス点滴静注用50mg 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 100mL 療法名:ブレンツキシマブ ヘドチン (アドセトリス) 点滴注射: 点滴速度 140ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 1本あたり10.5mLの蒸留水で溶解 165mg以上は生食250mLで希釈	0mg 40mL 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:ブレンツキシマブ ヘドチン (アドセトリス) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	11:30						