

レジメン名称 : リツキシマブ<sup>®</sup> (リツキサン) (500mg) (2回目～)

インターバル日数 : 1 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg)	500mg	500mg	500	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:リツキシマブ <sup>®</sup> (リツキサン) (500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 102mL/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 穿刺後カロナール内服	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:リツキシマブ <sup>®</sup> (リツキサン) (500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 90mL/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 30分毎に投与速度UP可能 100→200→300→400mL/h	0mg 450mL	1回						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:リツキシマブ <sup>®</sup> (リツキサン) (500mg) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 600mL/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用	1B	1回						