

レジメン名称 : リツキシマブ<sup>®</sup> (リツキサン) (700mg) (2回目～)

インターバル日数 : 1 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称                | 標準値   | 上限値   | 設定量 | 単位 |
|----|------|---------------------|-------|-------|-----|----|
| 02 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) | 200mg | 200mg | 200 | mg |
| 03 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) | 500mg | 500mg | 500 | mg |

| RP | 手技   | 薬剤名称  | 用量/単位        | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|---|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ポララミン注 5mg/1mL<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:リツキシマブ <sup>®</sup> (リツキサン) (700mg) (2回目～)<br>点滴注射:<br>点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>穿刺後カロナール内服                                    | 1A<br>1B     | 10:00 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg)<br>生理食塩液 250mL<br>療法名:リツキシマブ <sup>®</sup> (リツキサン) (700mg) (2回目～)<br>点滴注射:<br>点滴速度 90ml/h : *点滴時間 2時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>30分毎に投与速度UP可能<br>100→200→300→400mL/h     | 0mg<br>180mL | 10:30 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg)<br>生理食塩液 500mL<br>療法名:リツキシマブ <sup>®</sup> (リツキサン) (700mg) (2回目～)<br>点滴注射:<br>点滴速度 269ml/h : *点滴時間 1.67時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>30分毎に投与速度UP可能<br>100→200→300→400mL/h | 0mg<br>450mL | 12:00 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL<br>療法名:リツキシマブ <sup>®</sup> (リツキサン) (700mg) (2回目～)<br>点滴注射:<br>点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1<br>フラッシュ用   | 1B           | 1回    |  |  |  |  |  |  |