

レジメン名称 : 呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg)	360mg	360mg	360	mg
05	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	525mg/m2	500	mg/m2
07	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	6 (AUC)	1000mg	6	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1 B	10:00						
02	点滴注射	オプジーボ注 (20mg 120mg 240mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1 B	10:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1 B	10:30						
04	点滴注射	デキササート注射液 1.65mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2 A 1 V 1 B	10:35						
05	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1 B	11:05						
06	点滴注射	生理食塩液 100mL	1 B	11:15						

レジメン名称 : 呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
07	点滴注射	療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL	0mg 1袋	11:45						
08	点滴注射	療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/Ipi/Nivo(day22) ・アプレ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	13:15						