

基準日： Day 1

| RP | 手技   | 薬剤名称                             | 標準値      | 上限値 | 設定量        | 単位  |
|----|------|----------------------------------|----------|-----|------------|-----|
| 03 | 点滴注射 | キイトルーダ静注 100mg                   | 200mg    |     | 200mg      | 200 |
| 05 | 点滴注射 | ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg) | 500mg/m2 |     | 525mg/m2   | 500 |
| 06 | 点滴注射 | カルボプラチン注 (50mg 150mg 450mg)      | 5 (AUC)  |     | 5.25 (AUC) | 5   |

[illegible]

| RP | 手技   | 薬剤名称                                                                                                                                                                       | 用量/単位     | 処方1回量 | Day1  |  |  |  |  |  |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 06 | 点滴注射 | 葉酸（パ°ンビ°タン）処方<br>メチコバル筋注（9週毎）<br>カルボ°プラチン注（50mg 150mg 450mg）<br>ブドウ糖注 5% 500mL<br>療法名:呼内 PEM/CBDCA/Pembro（術前）・ホス<br>点滴注射:<br>点滴速度 336ml/h：＊点滴時間 1.5時間で<br>投与経路:末梢°ルートメ°ン 1 | 0mg<br>1袋 |       | 11:20 |  |  |  |  |  |
| 07 | 点滴注射 | アレルギーに注意<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:呼内 PEM/CBDCA/Pembro（術前）・ホス<br>点滴注射:<br>点滴速度 600ml/h：＊点滴時間 5分で<br>投与経路:末梢°ルートメ°ン 1                                                            | 1B        |       | 12:50 |  |  |  |  |  |