

レジメン名称 : 呼内 PEM/Dur/Tre (維持②)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	イジユド点滴静注 25mg/1.25mL	75mg	75mg	75	mg
04	点滴注射	イミフィンジ点滴静注 (120mg 500mg)	1500mg	1500mg	1500	mg
07	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	525mg/m2	500	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1B	10:00						
02	点滴注射	イジユド点滴静注 25mg/1.25mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:00						
04	点滴注射	イジユドフラッシュ用 イミフィンジ点滴静注 (120mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:05						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:05						
06	点滴注射	イミフィンジフラッシュ用 デキサート注射液 6.6mg	1V	12:10						

レジメン名称 : 呼内 PEM/Dur/Tre (維持②)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
07	点滴注射	グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋							
		ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 80mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	12:40						
08	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/Dur/Tre (維持②) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	12:50						