

レジメン名称 : 呼内 ETP/CBDCA・イメト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ベプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	80mg/m2	100mg/m2	80	mg/m2
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	5 (AUC)	6 (AUC)	5	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレタント125mg内服 day2.3確認 内服30分後開始	2A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ベプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 450ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30	10:30	10:30				
03	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 336ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アレルギーに注意	0mg 1袋	12:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	14:00	12:30	12:30				
05	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 ETP/CBDCA・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 201ml/h : *点滴時間 30分で	1A 1B		10:00	10:00				

