

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Neci・イムト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|---------------------------|-----------|--------|------|-------|
| 05 | 点滴注射 | ポートラーザ点滴静注液 800mg | 800mg | 800mg | 800 | mg |
| 07 | 点滴注射 | ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) | 1250mg/m2 | 2500mg | 1250 | mg/m2 |
| 08 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) | 75mg/m2 | 150mg | 75 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|------|--|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | 点滴注射 | 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イムト 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 8mL 1袋 | 09:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イムト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | 11:00 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イムト 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1.5V 1V 1B | 13:00 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イムト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1B | 13:30 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | ポートラーザ点滴静注液 800mg 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イムト 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生食50mL抜く | 0mg 200mL | 13:35 | | | | | | |
| 06 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL | 1B | 14:35 | | | | | | |

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|------|--|-----------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 07 | 点滴注射 | 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL | 0mg 1B | 14:40 | | | | | | |
| 08 | 点滴注射 | 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL | 0mg 1袋 | 15:10 | | | | | | |
| 09 | 点滴注射 | 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 500mL | 1袋 | 16:10 20:10 | | | | | | |
| 10 | 点滴注射 | 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 20% マンニトール注射液 300mL | 1B | 16:10 | | | | | | |
| 11 | 点滴注射 | 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 | 1袋 | 18:10 | | | | | | |
| 12 | 点滴注射 | 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL | 1V 1B | | 10:00 | 10:00 | | | | |
| 13 | 点滴注射 | 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 | 1袋 | | 10:00 | 10:00 | | | | |

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト[®]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day8 | | | | | | |
|----|------|--|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 8mL 1袋 | | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1袋 | | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1.5V 1V 1B | | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 10:30 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | ポートルーザ点滴静注液 800mg 生理食塩液 250mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 生食50mL抜く | 0mg 200mL | 10:35 | | | | | | |
| 06 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 11:35 | | | | | | |
| 07 | 点滴注射 | ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト [®] | 0mg 1B | 11:40 | | | | | | |

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day8 | | | | | | |
|----|------|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 08 | 点滴注射 | 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト | 0mg 1袋 | | | | | | | |
| 09 | 点滴注射 | 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト | 1袋 | | | | | | | |
| 10 | 点滴注射 | 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト | 1B | | | | | | | |
| 11 | 点滴注射 | 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト | 1袋 | | | | | | | |
| 12 | 点滴注射 | 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト | 1V 1B | | | | | | | |
| 13 | 点滴注射 | 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト | 1袋 | | | | | | | |
| 14 | 点滴注射 | 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 グラネセロン点滴静注 ^{ハック} 3mg/50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト | 1袋 | 10:00 | | | | | | |

レジメン名称 : 呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day8 | | | | | | |
|----|------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 15 | 点滴注射 | 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 GEM/CDDP/Neci・イメト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1B | 12:10 | | | | | | |