

レジメン名称 : 呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day8) インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|-------------------|----------|-------|-----|-------|
| 02 | 点滴注射 | アブラキサン点滴静注用 100mg | 100mg/m2 | 200mg | 100 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day8) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1V 1袋 | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | アブラキサン点滴静注用 100mg 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day8) 点滴注射: 点滴速度 60ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 30mL | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生食はアブラキサン採取量に変更 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 nabPTX (アブラキサン) / CBDCA / Atezo (day8) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用 | 1B | 11:00 | | | | | | |